

# Лекция 6 (6.05.2015)

## Совершенно поляризуемые электроды. Физические методы исследования адсорбатов.

Адсорбция с переносом заряда, адатомы

Соадсорбция ионов и атомов

Потенциалы нулевого полного и свободного заряда

Необратимая адсорбция

In situ физические методы исследования адсорбции

- оптические
- рентгеноспектроскопические
- дифракционные
- зондовые
- кварцевое микровзвешивание

## Снова классификация электродов (теперь - связанная с особенностями их заряжения)

**Идеально поляризуемый:** весь подводимый заряд затрачивается только на изменение свободного заряда электрода, компенсируемого адсорбцией ионов. *Про такие электроды была речь в лекции Interface\_I.*

**Совершенно поляризуемый:** подводимый заряд затрачивается как на изменение свободного заряда электрода, так и на протекание реакции



в которой реагент и продукт (Ox и Red) находятся исключительно в адсорбированном состоянии.


В обоих случаях в стационарных условиях при постоянном потенциале ток не протекает (заряжение заканчивается). Если же Ox и(или) Red существуют в растворе, ток продолжает течь все время – **это неполяризуемый электрод.**

## Строение межфазной границы, совершенно поляризуемый электрод (все еще условно!)

**Отличие:**  
**адсорбция с переносом заряда**  
**(это всегда хемосорбция)**


В результате переноса заряда с аниона (или на катион) получаются **адатомы**.

В плотной части «двойного слоя» всегда оказывается более одного компонента.




## Совершенно поляризуемые электроды

Образование адатомов (адсорбция с переносом заряда):



$$\Delta Q = \Delta q \pm F \Delta A_i$$



$$dE = \frac{d\mu_{H^+}}{F} - \frac{d\mu_H}{F}$$

$$d\sigma = -\Gamma_H d\mu_H - \Gamma_{H^+} d\mu_{H^+} - \sum_{i \neq H, H^+} \Gamma_i d\mu_i$$

Эксперимент:

Вольтамперометрия  
 $(E = E_{\text{начальн}} + vt \rightarrow I)$

$$\Delta Q = \text{const} \cdot v$$

$$\longrightarrow A_i(E)$$

Хронопотенциометрия  
(кривые заряжения,  
 $I = \text{const} \rightarrow E$ )

$$\Delta Q = I \cdot t$$


Поправка на заряжение  
ионного «двойного слоя»



# Heterogeneous catalysis on atomic scale

Gerhard Ertl\*

*Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4-6, D-14195 Berlin, Germany*



Ru(0001): Residence times at various distances  $d$  to neighbouring adatom  $\tau$  [ms] at 300 K

$d/a_0$	$\sqrt{3}$	2	$\sqrt{7}$	3	$\infty$
$\tau$	14	220	66	43	60


“Most finely divided catalysts must have structures of great complexity. In order to simplify our theoretical consideration of reactions at surfaces, let us confine our attention to reactions on plane surfaces. If the principles in this case are well understood, it should then be possible to extend the theory to the case of porous bodies. In general, we should look upon the surface as consisting of a checkerboard ...”

I. Langmuir, *Trans. Faraday Soc.* 17 (1922), 607


Из нобелевской лекции (2007),  
[http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/chemistry/laureates/2007/ertl-lecture.html](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/ertl-lecture.html)

# Монокристаллические электроды


Получение: метод J. Clavilier



## Кривая заряжения




## Платиновый электрод




Вольтамперограмма  
(заряд  $\Delta Q$  можно  
рассчитать по  
площади под кривой)

Адсорбция водорода  
чувствительна к  
Кристаллографии  
поверхности



Pt(110)



Pt(111)

## 7.2

# Адсорбционный метод изучения заряженных межфазных границ (определение изменения поверхностной концентрации)

Оценки:

- заряд *идеально поляризуемого* электрода в реальных системах может достигать 30 мКл/см<sup>2</sup>;
- полный заряд *совершенно поляризуемого* электрода может изменяться на 200-400 мКл/см<sup>2</sup>



Изменение состава раствора в результате формирования адсорбционного слоя на 1 см<sup>2</sup> истинной поверхности не превышает

Метод  
радиоактивных  
индикаторов

1 наномоля



Прямое определение адсорбции возможно на электродах с развитой поверхностью из малого объема раствора


титрование

спектрофотометрия


электропроводность



## Адсорбция ионов – свободный заряд



Метод радиоактивных индикаторов




Адсорбционный метод

## 7.6


### Совершенно поляризуемые электроды - соадсорбция

**Underpotential deposition (upd)** – образование адатомов при потенциалах положительнее равновесного



RHE – reversible hydrogen electrode  
(обратимый водородный электрод в том же растворе)


**SAM - самоорганизованные (self-arranged) монослои молекул с концевыми SH-группами (thiol terminated) – необратимая адсорбция**



**Самопроизвольное осаждение:**

- из спиртовых растворов
- из газовой фазы

**«Разбавление»  
функциональных молекул  
алкантиолами**



**Удаление тиолов с поверхности:**

восстановительное



окислительное



## In situ оптические методы

Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIRS) – ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием

Electromodulation infrared spectroscopy (EMIRS) – с модуляцией Потенциала

Subtraction normalized infrared spectroscopy (SNIFTIRS) – с нормализацией вычитанием

Нелинейно-оптические методы:  
 - *second harmonic generation* (SHG) – генерация второй гармоники;  
 - *surface enhanced Raman scattering* (SERS) – усиленное поверхностью комбинационное рассеяние

Модуляционная спектроскопия отражения (электроотражение)

Эллипсометрия

Фотоэлектронная  
эмиссия



Интерферометрия

ИК  
200 – 4000 см<sup>-1</sup>


Видимая область  
350 – 800 нм

УФ

## Пример: SNIFTIRS



(адсорбция на золоте)



## Другие *in situ* методы

### Зондовые методы

STM – scanning tunneling microscopy (сканирующая туннельная микроскопия)

AFM – atomic force microscopy (атомно-силовая микроскопия)

### Рентгеновская спектроскопия

EXAFS – extended X-ray absorption fine structure (метод расширенной тонкой структуры рентгеновского поглощения)


XANES – X-ray absorption near edge structure (спектроскопия структуры рентгеновского поглощения вблизи порога поглощения)

\*\*\*\*\*

XRD, ND – X-ray and neutron diffraction (рентгеновская и нейтронная дифракция)



DEMS – differential electrochemical mass-spectroscopy (дифференциальная электрохимическая масс-спектрометрия)

EQCM (EQCN) – electrochemical quartz crystal micro(nano)balance (кварцевое<sub>14</sub> микро- или нановзвешивание)




## Пример: SXS

## Индуцированная адсорбцией бромида реконструкция Au




## Пример: EQCM, соадсорбция






Приближенное соотношение для изменений резонансной частоты и массы:

$$\Delta f_0 = -A f_0^2 \Delta m$$

Не обратимая адсорбция SiW12





*In situ* зондовые методы при визуализации молекулярных и наноразмерных объектов: искажения (неидеальность зонда)



Туннельная спектроскопия:  
локальное определение проводимости  
в туннельном зазоре

$$I_{\text{тун}} = \text{const} \cdot U_{\text{тун}} \cdot e^{-\text{const}' \sqrt{V_{\text{тун}}} H_{\text{тун}}}$$


## Этантиол на Au(111)



## Домены в слоях

тиолов:


- ступени на подложке
- разная ориентация
- рассогласованность с размерами атомов подложки



зеркальные  
домены

## Бутантиол на Au(100)

15x15 nm<sup>2</sup>




Langmuir 19 (2003) 830

Langmuir 15 (1999) 2435


## Моделирование *in situ* STM-изображений

цистеин



**Ab Initio Quantum-Chemical Calculations  
in Electrochemistry**

**Marc T. M. Koper**



**Кластерные модели электрода**


**Моделирование заряда и потенциала металла**

**Моделирование хемосорбции на заряженной поверхности**

**Моделирование адсорбции и диссоциативной адсорбции воды**

**Ab initio моделирование электродных реакций**

*Запросы на полный текст: tsir@elch.chem.msu.ru*



**Моделирование адсорбции из газовой фазы**

NIC Series, V. 39, pp. 177-184, 2008

<http://www.fz-juelich.de/nic-series/volume39>